处女膜及处女膜修补手术详解

电子书斋 www.dzbook.net收集整理

处女膜是覆盖在女性阴道口上的一层中间空状薄膜，一般厚约1～2毫米。膜的外面、内面均是湿润的粘膜，两层粘膜之间含有结缔组织、神经纤维和微小血管，膜中央有一小孔称为处女膜孔。处女膜孔的大小及厚度、韧性，每个人不完全相同。正常的处女膜具有保护作用，防止不洁分泌物进人阴道，对少女是一道屏障。

有些女青年由于运动、外伤、骑自行车、手淫，或婚前性行为导致处女膜破裂，往往会造成很大的心理负担，许多女性产生自卑心理。这些女青年把处女膜看得很重，尤其是那些没有性行为的破裂者，怕将来结婚时造成男方的误解，给幸福的婚姻带来危机。现在女性出现这种情况大可不必担忧，处女膜修补术可使处女膜恢复如初。此手术并不复杂，一般在门诊就可完成。通常的方法是将阴道口消毒后，先用2％的利多卡因做表面麻醉，然后再做阴道口的环形浸润麻醉，用小剪刀将破裂处的处女膜剪出整齐的创缘，用7／0尼龙线缝合，使处女膜北仅留可通过一个小指大的孔，术毕局部涂抗菌素软膏，手术即完成。手术时间短，无痛苦，不必住院，术后对日常工作、生活无任何影响。术后5天拆线，修补后的处女膜通常在1个月后就能像正常一样。

目前，对修复处女膜手术，有不同意见。医生的责任是医治创伤，治病救人，当然也包括心理的创伤，对那些由于外伤、运动或无不良愿望造成的处女膜意外破裂者，如果她们强烈要求，此修补手术是完全应该的，也是值得的。

[注意事项]

（1） 局部黏膜瓣瓦合法设计瓣时，近端要靠处女膜基部，使所形成瓣有足够宽度。

（2） 破裂缘之间缝合要无张力缝合。

（3） 缝合时亦可用5－0号丝线，但可吸收线缝合有无需拆线之优点。

（4） 术后口服抗生素3－5d，局部要涂抗生素软膏并保持局部清洁。

（5） 术后1周内避免大便过于干燥和剧烈运动及颠簸，尽量卧床

处女膜修补术:

未婚女性处女膜意外破裂，本人要求修复者可以施行。性交引

VISIT…

LANZAROTE Caliente.com

起的处女膜破裂而未生育者，多位于4和8点处；外伤导致的处女膜破裂多不规则。

术前准备:

避开月经期，术前三天每日冲洗阴道。

手术:

沿破裂处修剪形成创面，重新缝合。处女膜口以可容小指通过为度。

术后注意事项:

创口外涂眼药膏，应用抗生素，注意局部清洁，5－7天拆线。处女膜修补后，注意经血排除情况是否通畅，若有不畅则需据情况扩大处女膜口。什么人适合做处女膜修补术？

因性行为、剧烈运动、外伤、不正规的妇科检查等造成的处女膜破裂，都可考虑作处女膜修补术。

就诊 www.zsvcd.com收集

处女膜修补术前医师怎样检查？

第一次就诊时，医生会为你进行妇科检查，确定你是否有处女膜破裂。如果你有阴道炎或外阴炎，要治愈后才能手术；为保证伤口愈合，手术应选择在月经后至月经前10天内进行。

处女膜修补术如何施行？

由于个体因素，每个人处女膜修补的方法不完全相同。你的整形外科医师会根据情况为你选择合适的手术方法。

理解风险

幸运的是处女膜修补术的并发症较为少见。

手术过程

整形外科医师和所有工作人员尽可能使你的手术顺利和舒适。

术前我要作什么准备？

如你吸烟，术前应停止吸烟。阿司匹林和某些抗炎药物会引起出血增加，故术前一段时间应停用这些药物。

处女膜修补术一般在门诊进行，手术当日可以自己回家。

术后我应该注意什么？

术后口服抗生素预防感染。用1／5000的高锰酸钾液坐浴，每天两次，共7天。记住不要服用阿司匹林和抗炎药物，不要吸烟。术后一周内尽量减少活动。术后一个月内避免剧烈运动。

保持和整形外科医生的联系

你应该按要求回整形医院随诊，以便对你的情况进行评估。请记住，你离开手术室后，你和整形外科医师的关系并没有结束。在恢复期或以后，如果你有什么问题，请直接和你的整形外科医师联系。

在妇科门诊中经常发现一些年轻女性在门诊走廊中徘徊不定，想进去又不敢进去，最后鼓足勇气进去，向医生咨询也是吞吞吐吐，不敢直说来诊原因，在医生反复说明确保患者隐私的情况下，才说出要求做处女膜修补术。

事实上女性是非常脆弱的，很容易受到各种伤害，处女膜又是女性身体上最脆弱的器官，剧烈运动、骑跨、手淫都会引起它的破裂出血，不一定非得性接触。因而需要做这种手术的患者大可不必有过重的心理负担，但是在此需提醒的是，处女膜修补术虽然简便，但修复程度与医生的经验水平有很大关系，一些非专业医疗机构根本无条件，开展这一手术很容易带来感染，使受术者罹患阴道炎、宫颈炎等妇科疾病。因此，患者应谨慎选择治疗机构，确保安全。

电子书阅读制作交流 www.dzbook.net 电子书斋 专用章